


Uned 4 Haf 2018

1) $P(A) = 0.6$ $P(B) = 0.5$ $P(A \cap B) = 0.2$

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= 0.6 + 0.5 - 0.2$
 $= 0.9$

$1 - P(A \cup B) = 1 - 0.9$
 $= 0.1$

Y tebygolrwydd na fydd e'n ennill y naillgynnig na'r llall yw 0.1. ✓



$0.4 + 0.3 = 0.7$

Y tebygolrwydd y bydd e'n ennill un cynnig yn union yw 0.7.

c) $P(B \mid \text{ddim yn ennill } A) = \frac{P(B \cap \text{ddim yn ennill } A)}{P(\text{ddim yn ennill } A)}$
 $= \frac{0.3}{0.4}$
 $= \frac{3}{4}$

Uned 4 Itaf 2018

2) a) $P(\text{clirio } 1.7\text{m}) = 0.64$

$$P(\text{clirio ar y bro cyntaf}) + P(\text{clirio ar yr ail dro}) = 0.64$$

$$p + (1-p)p = 0.64$$

$$p + p - p^2 = 0.64$$

$$0 = p^2 - 2p + 0.64$$

$$0 = (p - 0.4)(p - 1.6)$$

$$\text{Naill ai } p - 0.4 = 0 \text{ neu } p - 1.6 = 0$$

$$\underline{p = 0.4}$$

$$p = 1.6$$

x Mwynagun

b) $P(\text{Dewis dau athletwr maes} \mid \text{Cyntaf yn wrywaidd})$

$$= \frac{P(\text{Dewis dau athletwr maes} \cap \text{Cyntaf yn wrywaidd})}{P(\text{Cyntaf yn wrywaidd})}$$

$$= \frac{\overset{(14F)}{P(\text{Dewis athletwr maes gwrywaidd, dewis athletwr maes})}}{\overset{(21L)}{P(\text{Cyntaf yn wrywaidd})}}$$

$$= \frac{\frac{9}{33} \times \frac{12}{32}}{\frac{22}{33}}$$

$$= \frac{\frac{9}{88}}{\frac{22}{33}}$$

$$= \frac{27}{176}$$

Uned 4 Haf 2018

- 3) a) i) Mae'n bosib modelu amser aros Antonio eŋor dosraniad unffurf. Gadewch i X ddynodi amser aros Antonio. Yna $X \sim U[0, 12]$

$$\begin{aligned} \text{ii) } E(X) &= \frac{a+b}{2} \\ &= \frac{0+12}{2} \\ &= \frac{12}{2} \\ &= 6 \text{ munud} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{(b-a)^2}{12} \\ &= \frac{(12-0)^2}{12} \\ &= \frac{144}{12} \\ &= 12 \text{ munud} \end{aligned}$$

- iii) Mae'r trenau yn ddibynadwy h.y. maent yn cyrraedd ar amser, bob tro, i'r eiliad.

b) i) $P(9 < X < 19) = P(9 < X < 12)$ heb gael ei sylw wedi i dynnu
+ $P(12 < X < 19)$ gyda'i sylw wedi i dynnu

$$= (1 - 0.12) \times \frac{12-9}{12} + 0.12 \times \frac{7}{12}$$

$$= 0.88 \times \frac{3}{12} + 0.12 \times \frac{7}{12}$$

$$= 0.22 + 0.07$$

$$= \underline{0.29}$$

ii) $P(\text{trên cyntaf} \mid \text{aros rhwng 9 ac 19 munud})$
 $= \frac{P(\text{trên cyntaf} \cap \text{aros rhwng 9 ac 19 munud})}{P(\text{aros rhwng 9 ac 19 munud})}$

$$= \frac{0.22}{0.29} = \frac{22}{29}$$

Uned 4 Haf 2018

4) a) wrthedrych ar y dosraniad, mae'n ymddangos yn gymesur, gyda mwy o eitemau data yn y canol, a'r gweddill yn tapro tuag at y naill begwn neu'r llall.

b) $N(64, 15^2)$.

← o'r gyfrifiannell

$$i) P(60 \leq X \leq 70) = 0.2605588312$$

$$\begin{aligned} \text{Nifer o gartrefi} &= 80 \times 0.2605588312 \\ &= 20.84470649 \end{aligned}$$

= 21 o gartrefi, i'r cartref agosaf

$$ii) P(X \geq 90) = 0.04151821971 \quad \leftarrow \text{o'r gyfrifiannell}$$

$$\begin{aligned} \text{Nifer o gartrefi} &= 80 \times 0.04151821971 \\ &= 3.321457577 \end{aligned}$$

= 3 o gartrefi, i'r cartref agosaf

c) i) Mae 18 yn llai na 21 ac mae 6 yn fwy na 3 felly efallai nid hwn yw'r model gorau.

ii) Er mwyn lleihau'r canol a chynyddu'r naill begwn a'r llall gellid cynyddu'r gwyrriad safonol yn y model.

ch) Gall fod yn addas gan fod Gogledd Iwerddon (fel Cymru) yn rhan o'r Deyrnas Unedig ac efo economi tebyg i Gymru.

NEU: Nid yw'n addas oherwydd gall gwariant ar fwyd yng Ngogledd Iwerddon fod yn wahanol i'r gwariant ar fwyd yng Nghymru.

Uned 4 Haf 2018

5) a) Mae'r gwerth- p yn fwy na 0.05, ac felly nid oes cydberthyniad i'w weld rhwng prisiau Gwenith Porthi a phrisiau Ceirch Porthi.

b) Gadewch i: $H_0: \rho = 0$ yn erbyn
 $H_1: \rho \neq 0$
Prawf dwyochrog.

Cydberthyniad moment lluoswm: cyfernod = 0.653


Gyda lefel arnyddocâd 5%, ag $n=12$, mae'r tablau ystadegol yn nodi mai'r gwerth critigol yw 0.5760.

Gan fod $0.653 > 0.5760$, rydym efo dystiolaeth gref bod y cyfernod cydberthyniad yn fwy na sero. Felly, ar sail y dystiolaeth yma, rydym yn gwrthod H_0 ac yn derbyn bod cydberthyniad rhwng prisiau Gwenith Porthi a phrisiau awellt Gwenith.

c) Mae'r graff gyntaf yn cymharu grawn gwahanol (Gwenith a cheirch) tra bod yr ail graff yn cymharu dau gynnyrch gwenith.

Uned 4 Haf 2018

6)



Yn cymryd momentau o amgylch A:

Momentau clocwedd = Momentau gwrthglocwedd

$$8g \times 0.6 + 2g \times x + 15g \times 2.8 = 2R$$

$$47.04 + 19.6x + 411.6 = 2R$$

$$19.6x + 458.64 = 2R \quad \text{--- (1)}$$

Yn defnyddio grymoedd i fyny = grymoedd i lawr

$$R = 8g + 2g + 15g$$

$$R = 25g$$

$$R = 245 \text{ N}$$

Yn amnewid yn ôl yn (1):

$$19.6x + 458.64 = 2 \times 245$$

$$19.6x = 490 - 458.64$$


$$x = \frac{31.36}{19.6}$$

$$\underline{x = 1.6 \text{ m}}$$

Uned 4 Itaf 2018

7) a)

$F = ma$ ar y gwrthrych, yn fertigol,
 $\uparrow = +$ if.



$$0 - 0.5g - R = 0.5a$$
$$-0.5g - R = 0.5a$$

Mae $R \propto v$ ac mae $a = \frac{dv}{dt}$
Felly $R = Kv$

Felly $-0.5g - Kv = 0.5 \frac{dv}{dt}$

$$-g - 2Kv = \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = -9.8 - 2Kv$$

Os yw $v = 0.2 \text{ ms}^{-1}$, mae $R = 0.08 \text{ N}$

felly $0.08 = K \times 0.2$

$$\frac{0.08}{0.2} = K$$

$$K = 0.4$$

Felly $\frac{dv}{dt} = -9.8 - 2(0.4)v$

$$\frac{dv}{dt} = -9.8 - 0.8v$$

✓

$$b) \frac{dv}{dt} = -9.8 - 0.8v$$

$$dv = (-9.8 - 0.8v) dt$$

$$\frac{dv}{-9.8 - 0.8v} = dt$$

$$\int \frac{dv}{-9.8 - 0.8v} = \int dt$$

$$-\int \frac{dv}{9.8 + 0.8v} = \int dt$$

$$-\left(\frac{1}{0.8} \ln |9.8 + 0.8v| \right) = t + c$$

0s yw $t = 0$ s, mae $v = 24 \text{ ms}^{-1}$, felly

$$-\frac{1}{0.8} \ln |9.8 + 0.8 \times 24| = 0 + c$$

$$-\frac{1}{0.8} \ln(29) = c$$

$$\text{Felly } -\frac{1}{0.8} \ln |9.8 + 0.8v| = t - \frac{1}{0.8} \ln(29)$$

$$\frac{1}{0.8} \ln(29) - \frac{1}{0.8} \ln |9.8 + 0.8v| = t$$

$$\frac{1}{0.8} \ln \left| \frac{29}{9.8 + 0.8v} \right| = t$$

$$\ln \left| \frac{29}{9.8 + 0.8v} \right| = 0.8t$$

$$\frac{29}{9.8 + 0.8v} = e^{0.8t}$$

$$29 = (9.8 + 0.8v)e^{0.8t}$$

$$29e^{-0.8t} = 9.8 + 0.8v$$

$$29e^{-0.8t} - 9.8 = 0.8v$$

$$v = \frac{29e^{-0.8t} - 9.8}{0.8}$$

$$v = 36.25 e^{-0.8t} - 12.25$$

c) Ar bwynt uchaf y mudiant, mae $v = 0 \text{ ms}^{-1}$.

$$\text{Felly } 0 = 36.25 e^{-0.8t} - 12.25$$

$$\frac{12.25}{36.25} = e^{-0.8t}$$

$$e^{-0.8t} = \frac{49}{145}$$

$$-0.8t = \ln\left(\frac{49}{145}\right)$$


$$t = \frac{-1}{0.8} \ln\left(\frac{49}{145}\right)$$

$$t = 1.356141805$$

$$t = 1.36 \text{ s i 2 le degol}$$

Uned 4 Haf 2018

8)



$$\mu = 0.3$$

- a) Nid yw'r gwrthrych yn symud yn berpendicwlar i'r plân.
Felly $R = 60g \cos 20^\circ$

$$\begin{aligned} F_{\text{frithiant}} &\leq \mu R \\ &\leq 0.3 \times 60g \cos 20^\circ \\ &\leq 176.4 \cos 20^\circ \\ &\leq 165.7617783 \dots \end{aligned}$$

Gran fod $15 < 165.7617783$, yn rhan (a) y cwestiwn mae'r gwrthrych yn symud i lawr y plân.

$F = ma$, yn baralel i'r plân, $\downarrow = +$ i f

$$\begin{aligned} 60g \sin 20^\circ - T - F_{\text{frithiant}} &= 60a \\ 60g \sin 20^\circ - 15 - 176.4 \cos 20^\circ &= 60a \\ 20.34606597 &= 60a \end{aligned}$$

$$a = 0.3391010995$$


$$\underline{a = 0.34 \text{ ms}^{-2}}$$

i 2 le degol

- b) Y grym cyd-effaith i fyny'r plân (heb ystyried ffrithiant) yw $350 - 60g \sin 20^\circ = 148.8921557 \text{ N}$.
Gran fod hwn yn llai na'r ffrithiant terfannol (165.7617783 N) ni fydd y gwrthrych yn symud i fyny'r plân.

Uned 4 Itaf 2018

9)



Cyflymder cychwynnol = 24.5 ms^{-1} .

Cydran lbrweddol: $u_x = 24.5 \cos 30^\circ$

$$u_x = \frac{49\sqrt{3}}{4} \text{ ms}^{-1}$$

Cydran fertigol: $u_y = 24.5 \sin 30^\circ$

$$u_y = 12.25 \text{ ms}^{-1}$$

Yn defnyddio $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ mewn cyfeiriad fertigol:

$$S_y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$S_y = 12.25t - \frac{1}{2}gt^2$$

Yn B, mae $S_y = 0$, felly

$$0 = 12.25t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = t(12.25 - 4.9t)$$

Nail ai $t = 0\text{s}$ neu $12.25 - 4.9t = 0$

(A)

$$12.25 = 4.9t$$

$$t = 2.5\text{s}$$

(B)

Cyrhaeddiad AB = pellter lbrweddol os yw $t = 2.5\text{s}$

$$= u_x \times \text{amser}$$

$$= \frac{49\sqrt{3}}{4} \times 2.5$$

+

$$= 53.04405598 \dots$$

$$= \underline{53.04\text{m}} \text{ i 2 le degol}$$

b) Pellter llorweddol wedi ei deithio gan P, ar amser t:

$$S_x = u_x t$$

$$S_x = \frac{49\sqrt{3}}{4} t$$

Pellter llorweddol wedi ei deithio gan Q:

Hefyd $S_x = \frac{49\sqrt{3}}{4} t$, ond mae Q yn cychwyn

I eiliad ar ôl P, felly, o gychwyn y clac pryd mae P yn cael ei daflu, y pellter llorweddol wedi ei deithio gan Q yw

$$S_x = \frac{49\sqrt{3}}{4} (t-1).$$

(Fel hyn, os yw $t=1$, mae S_x ar gyfer Q yn 0.)

Pan maent yn gwrthdaro, mae cyfanswm y pellter llorweddol mae P a Q wedi'u teithio yn 53.04405598 (sef y pellter AB).

$$\text{Felly } \frac{49\sqrt{3}}{4} t + \frac{49\sqrt{3}}{4} (t-1) = 53.04405598$$

$$\frac{49\sqrt{3}}{4} t + \frac{49\sqrt{3}}{4} (t-1) = \frac{49\sqrt{3}}{4} \times 2.5$$

(Co'r dudalen gynt)

$$t + t - 1 = 2.5$$

$$2t = 3.5$$

$$t = \underline{1.755}$$

Yr uchder cyffwrddin yw $S_y = u_y t - \frac{1}{2} g t^2$

$$S_y = 12.25 \times 1.75 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.75^2$$

$$S_y = \underline{6.43125 \text{ m}}$$

Uned 4 Haf 2018

10) $\underline{F} = -3\underline{i} + 4\underline{j} - 5\underline{k}$

a) Yn defnyddio $\underline{F} = m\underline{a}$
 $\underline{a} = \frac{\underline{F}}{m}$

$$\underline{a} = \frac{-3}{2}\underline{i} + 2\underline{j} - \frac{5}{2}\underline{k}$$

Maint cyflymiad y gronyn yw

$$|\underline{a}| = \sqrt{\left(\frac{-3}{2}\right)^2 + 2^2 + \left(\frac{-5}{2}\right)^2}$$

$$|\underline{a}| = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ ms}^{-2}$$

b) $\underline{v} = \int \underline{a} \, dt$

$$\underline{v} = \int \frac{-3}{2}\underline{i} + 2\underline{j} - \frac{5}{2}\underline{k} \, dt$$

$$\underline{v} = \left(\frac{-3}{2}\underline{i} + 2\underline{j} - \frac{5}{2}\underline{k} \right)t + \underline{C}$$

Os yw $t=0$, mae $\underline{v} = 3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k}$, felly

$$3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k} = \left(\frac{-3}{2}\underline{i} + 2\underline{j} - \frac{5}{2}\underline{k} \right)(0) + \underline{C}$$

$$\underline{C} = 3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k}$$

$$\text{Felly } \underline{v} = \left(\frac{-3}{2}\underline{i} + 2\underline{j} - \frac{5}{2}\underline{k} \right)t + 3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k}$$

$$\underline{r} = \int \underline{v} dt$$

$$\underline{r} = \int \left(\frac{-3\underline{i} + 2\underline{j} - 5\underline{k}}{2} \right) t + 3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k} dt$$

$$\underline{r} = \left(\frac{-3\underline{i} + 2\underline{j} - 5\underline{k}}{2} \right) \frac{t^2}{2} + (3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k})t + \underline{c}$$

Os yw $t=0$, mae $\underline{r} = 2\underline{i} - 7\underline{j} + 9\underline{k}$, felly

$$2\underline{i} - 7\underline{j} + 9\underline{k} = \left(\frac{-3\underline{i} + 2\underline{j} - 5\underline{k}}{2} \right) \left(\frac{0^2}{2} \right) + (3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k})(0) + \underline{c}$$

$$\underline{c} = 2\underline{i} - 7\underline{j} + 9\underline{k}$$

Felly

$$\underline{r} = \left(\frac{-3\underline{i} + 2\underline{j} - 5\underline{k}}{2} \right) \frac{t^2}{2} + (3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k})t + 2\underline{i} - 7\underline{j} + 9\underline{k}$$

Os yw $t=2s$, mae

$$\underline{r} = \left(\frac{-3\underline{i} + 2\underline{j} - 5\underline{k}}{2} \right) \left(\frac{2^2}{2} \right) + (3\underline{i} - 2\underline{j} + \underline{k})(2) + 2\underline{i} - 7\underline{j} + 9\underline{k}$$

$$\underline{r} = -3\underline{i} + 4\underline{j} - 5\underline{k} + 6\underline{i} - 4\underline{j} + 2\underline{k} + 2\underline{i} - 7\underline{j} + 9\underline{k}$$

$$\underline{r} = 5\underline{i} - 7\underline{j} + 6\underline{k}$$